

Datum CVA, recidief (ja/nee), lateralisatie CVA (re/li hemisfeer, hersenstam, cerebellum, anders nl:), type CVA (bloeding, infarct, anders nl:)

• **Aanvullende (hetero)anamnese:**

- Voorkeurshand
- Pre-existent functioneren: beroep, ADL, vrije tijdsbesteding:
- Woonsituatie: zelfstandig wonend; alleen/samen; gelijkvloers/etages; trap ja/nee; leuning bij trap op gaan: re/li; lift: ja/nee; andere obstakels in huis: drempels, tapijt, deurdrangers
- Vervoer vóór CVA: auto, fiets, wandelen, loophulpmiddel binnenshuis/buitenshuis
- Partner: ja/nee; gezond ja/nee; werkend: ja/nee; voormalig beroep; partner zorgbehoefstig; verzorgende kinderen
- Reeds aanwezige hulpverlening: mantelzorg, huishoudelijke hulp; thuiszorg; wijkverpleging; maaltijdservice; personenalarmering
- Relevante medische voorgeschiedenis:
 - Tractus circulatorius: (angina pectoris, claudicatio, anders)
 - Tractus respiratorius:
 - Tractus locomotorius:
 - Tractus digestivus:
 - Tractus urogenitalis:
- Relevante psychiatrische voorgeschiedenis:
- Risicofactoren: roken; alcohol
- Medicatie:
- ADL mogelijkheden: **BI**

Aanvullend onderzoek:

Algemene indruk: coöperatief, gemotiveerd, belastbaar

Communicatie en neuropsychologische functiestoornissen:

Communicatie; oriëntatie in plaats en persoon; geheugen en/of concentratie; is er sprake van visuele en/of somatosensorische inattentie (neglect); stoornissen in de praxis

Hersenenuwen: hemianopsie, dysartrie, slikstoornissen

Complicaties: diepe veneuze trombose; decubitus; handoedeem

Ernst van de parese: Vinden bewegingen plaats in synergistische patronen; is gedissocieerd bewegen mogelijk

Spierkracht:

MI:onderste extremitet; bovenste extremitet

Coördinatie:

Gewrichtsmobiliteit: passief:

- Somatosensorische functies: vitale sensibiliteit en/of gnostische sensibiliteit (houdings- en bewegingszin)
- Spiertonus: Is er sprake van weerstand tegen passief bewegen
- Pijn: Is er sprake van een algemeen pijnsyndroom/hemiplegische schouderpijn
- Houding handhaven:
 - problemen bij liggen
 - problemen met evenwicht tijdens zitten: **TCT, TIS**
 - problemen met evenwicht bij het staan: **BBS**
- Houding veranderen:
 - Omrollen naar paretische zijde
 - Omrollen naar niet paretische zijde
 - Transfer van lig naar zit
 - Transfer van zit naar zit
 - Transfer van zit naar stand v.v.
 - **TCT, BBS**
- Dragen, verplaatsen en manipuleren van voorwerpen:
 - (op)tillen en meenemen/dragen: **BI**
 - Problemen gebruik paretische hand: **FAT**
- Verplaatsen:
 - Lopen binnenshuis en/of buitenshuis: **FAC, TUG, 10 MLT, BBS**,
 - Valincidenten:
 - Verhoogd valrisico: **GVS**
- Gebruik hulpmiddelen
 - Problemen met zelfstandig verplaatsen met rolstoel
 - Adequaat gebruik van (loop)hulpmiddelen
- Gebruik van vervoermiddelen:
 - Problemen met zelfstandig fietsen
 - Problemen autorijden
 - Gebruik OV:
- ADL:
 - Problemen met basale of bijzondere ADL-vaardigheden
- Cognitie: **Moca**

Doelen vroege revalidatiefase (< 3 mnd):

Doelen late revalidatiefase (4-6 mnd):

Doelen chronische fase (> 6 mnd):